



Camposanto - Cavezzo - Concordia s/S - Finale E. - Medolla - Mirandola
San Felice s/P - San Possidonio - San Prospero

PREVENZIONE E CONTROLLO NUMERICO DEGLI ANIMALI INFESTANTI NELL'AREA NORD MODENESE (TOPI, INSETTI EMATOFAGI, COLOMBI E NUTRIE)

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA LORO PROLIFERAZIONE

L'UNIONE FA LA FORZA

www.unioneareanord.mo.it



caussadesemences

Semina il meglio, semina Caussade!

Caussade Semences Italia srl
Via Monte Bianco, 24 - Massa Finalese (MO)
Tel. 0535 99109
info@caussade-semences.it
www.caussade-semences.it

Le petit boutique
TABACCHERIA



BONAVITA MARCO

APERTO TUTTI I GIORNI
dalle ore 7,30 alle 13
e dalle 14,30 alle 20

Via G. Agnini, 15 - Mirandola (MO)
Tel. 0535.24539 - Cell. 340.5038366

senza o la sola casuale presenza in altre zone anche limitrofe.

Il Ratto nero è inserito nell'elenco delle 100 specie invasive più dannose al mondo. Rispetto al Ratto grigio, il Ratto nero presenta generalmente **corporatura più slanciata**, ma gli esemplari più piccoli e scuri di ratto delle chiaviche sono simili ai ratti neri. I ratti neri vivono in gruppi misti comprendenti numerosi esemplari di ambe-

due i sessi. Fra i maschi è presente una rigida gerarchia, per l'accesso al cibo o alle **femmine: queste ultime sono più aggressive rispetto ai maschi** e tendono a spostarsi di meno nell'ambiente del territorio che ciascuno gruppo delimita e che misura in genere circa un centinaio di metri quadrati. Anche fra le **femmine è presente una gerarchia, alcune di esse sono dominanti rispetto a tutti** gli altri ap-

partenenti al gruppo, ad eccezione del maschio dominante.

I ratti neri si curano poco del proprio territorio, difendendo in modo aggressivo dagli intrusi solo le aree strategiche come le provviste di cibo. Questi animali sono attivi a tutte le ore, soprattutto dopo il tramonto: durante il giorno, i ratti neri tendono a riposarsi in nidi voluminosi e di forma globulare, costruiti con steli d'erba e foglie, si-

tuati generalmente in alto, ad esempio fra le fronde di un albero o ai piani alti di un edificio: solo raramente i ratti neri scavano tane ipogee.

Il Ratto nero è erbivoro: si nutre di cereali, frutta, granaglie e contamina il cibo con urina ed escrementi, rendendosi così veicolo di numerose malattie.

All'occorrenza, il Ratto nero mangia qualsiasi cosa riesca a digerire. I ratti neri non hanno un

periodo riproduttivo preciso e le femmine possono **riprodursi durante tutto l'anno. Il Ratto nero raramente vive più di un anno in natura, mentre in cattività raggiunge i quattro anni di vita.**

Ratto grigio o ratto delle chiaviche

Il Ratto grigio, noto anche come ratto delle chiaviche, è un mammifero roditore della famiglia dei Muridi. È la spe-


cie più comune e diffusa di Rattus, presente in tutto il mondo. In Europa ha soppiantato il preesistente Ratto nero fra la fine del Medioevo e la Rivoluzione industriale. Il **Ratto grigio è presente ovunque sia presente l'uomo**, con poche eccezioni (l'Antartide, il Canada e alcune riserve speciali in Nuova Zelanda). Viene considerato una delle specie animali di maggior successo. In natura, la **specie è legata a**

R.F. CHOPPER

MANUTENZIONE - CUSTOMIZZAZIONE - RESTAURI
RIPARAZIONE MOTOCICLETTE

Via della Locanda 4/2
MEDOLLA (MO)
0535.730321 - 371.3134485

www.rfchopper.it - info@rfchopper.it



SPORTSTER 883



SOFTAIL DELUXE